

Rapaces migrateurs forestiers

Bondrée apivore et Circaète Jean-le-Blanc



© A. Audevard

Bondrée apivore
(*Pernis apivorus*)



© C. Aussaguel

Circaète Jean-le-Blanc
(*Circaetus gallicus*)

Habitats préférentiels

Ces deux rapaces sont migrateurs au long court, ils hivernent au sud du Sahara. Le Circaète Jean-le-Blanc occupe à la fois les secteurs riches en reptiles, base de son alimentation, et les milieux boisés, indispensables à sa nidification. La Bondrée recherche des habitats globalement similaires, une alternance de massifs boisés où elle pourra nicher et des zones ouvertes type prairies où elle trouvera des nids d'hyménoptères dont elle se nourrit.

Niveau de sensibilité géographique pour les rapaces forestiers

Circaète Jean-le-Blanc et Bondrée apivore

Avertissement :

Niveau de sensibilité géographique définis en l'état actuel des connaissances au mois d'avril 2020, d'après les bases de données faune-paca.org (LPO PACA) et faune.silene.eu

Légende

Natura 2000 FR9301569

Niveau de sensibilité par maille de 1km²

Absence de donnée

Moyen

Fort

Très fort



0 1,5 3 km

Définition des niveaux de sensibilité géographique

Absence de donnée : espèces non signalées, ou absence de prospection dans la maille. Présence non exclue.

Moyen : espèces signalées dans la maille et nidification possible.

Fort : espèces signalées fréquemment dans la maille et nidification possible.

Très fort : espèces signalées fréquemment dans la maille et nidification probable ou certaine.

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Sensibilité saisonnière												

Période très sensible (correspond à la période de recherche d'un territoire et de la couvaison jusqu'à l'éclosion des œufs)

Période sensible (correspond à la période d'élevage des jeunes)

Absence (hivernage en Afrique)

Réalisé avec le soutien
de la Métropole Nice Côte d'Azur

MÉTROPOLE
NICE CÔTE D'AZUR

l'Europe
s'engage
Provence-Alpes-Côte d'Azur
avec le **PRADER**

NATURA 2000

RÉGION SUD
PROVENCE ALPES
CÔTE D'AZUR

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDARITÉ


Réalisation

LPO

AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
Provence-Alpes-Côte d'Azur


Rapaces rupestres

Aigle royal, Faucon pèlerin, Grand-duc d'Europe




© A. Simon

Aigle royal
(*Aquila chrysaetos*)



© C. Aussaguel

Faucon pèlerin
(*Falco peregrinus*)



© A. Simon

Grand-duc d'Europe
(*Bubo bubo*)

Habitats préférentiels

Ces quatre rapaces sont sédentaires. Dans les Alpes-Maritimes, ces oiseaux se cantonnent sur des sites rupestres. Ils construisent leur aire de nidification en falaise. L'Aigle royal peut exploiter un territoire de chasse variant de 40 km² à plus de 150 km² en fonction de la densité des proies potentielles. Aigle royal, Faucon pèlerin et Grand-duc d'Europe sont des prédateurs. Globalement, ces rapaces ont besoin de zones dégagées pour trouver leur nourriture.

Niveau de sensibilité géographique pour les rapaces rupestres

Aigle royal, Grand-duc d'Europe, Faucon pèlerin

Avertissement :


Niveau de sensibilité géographique définis en l'état actuel des connaissances au mois d'avril 2020, d'après les bases de données faune-paca.org (LPO PACA) et faune.silene.eu

Légende

 Natura 2000 FR9301569

Niveau de sensibilité par maille de 1km²

-  Absence de donnée
-  Moyen
-  Fort
-  Très fort



Définition des niveaux de sensibilité géographique

Absence de donnée : espèces non signalées, ou absence de prospection dans la maille. Présence non exclue.

Moyen : espèces signalées dans la maille et nidification possible.

Fort : espèces signalées fréquemment dans la maille et nidification possible.

Très fort : espèces signalées fréquemment dans la maille et nidification probable ou certaine.

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Sensibilité saisonnière												

 Période très sensible (correspond à la période de recherche d'un territoire et de la couvaison jusqu'à l'éclosion des œufs)

 Période sensible (correspond à la période d'élevage des jeunes)

 Période la moins sensible

Réalisé avec le soutien
de la Métropole Nice Côte d'Azur

MÉTROPOLE
NICE CÔTE D'AZUR

l'Europe
s'engage
Provence-Alpes-Côte d'Azur
avec le **PRADER**

NATURA 2000

RÉGION SUD
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDARITÉ


Réalisation

LPO

AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
Provence-Alpes-Côte d'Azur


Vautours

Vautour fauve et Vautour moine



© A. Audevard

Vautour fauve
(*Gyps fulvus*)



© A. Audevard

Vautour moine
(*Aegypius monachus*)

Habitats préférentiels

Ces deux espèces ne sont pas nicheuses dans les Alpes-Maritimes. La seule colonie reproductrice en PACA se situe dans les gorges du Verdon. La prospection alimentaire est conditionnée selon les saisons par la météo et la présence de troupeaux de brebis. Cantonnés sur le Grand Canyon de novembre à février, ils prospectent l'arrière-pays grassois et vençois de mars à juin. Ensuite, ils suivent les troupeaux transhumants dans le haut verdon et le Mercantour de juillet à octobre, notamment autour du Mont Mounier, où ils trouvent de nombreux cadavres d'ongulés facilement accessibles. Le Vautour moine est beaucoup plus rare. Les Vautours moines prospectent également les alpages du Mercantour, soit avec les Vautours fauves, soit seuls.

Niveau de sensibilité géographique pour les Vautours

Vautour fauve et Vautour moine

Avertissement :


Niveau de sensibilité géographique définis en l'état actuel des connaissances au mois d'avril 2020, d'après les bases de données faune-paca.org (LPO PACA) et faune.silene.eu

Légende

Natura 2000 FR9301569

Niveau de sensibilité par maille de 1km²

Absence de donnée
 Moyen
 Fort



Définition des niveaux de sensibilité géographique

Absence de donnée : espèces non signalées, ou absence de prospection dans la maille. Présence non exclue.

Moyen : espèces signalées fréquemment dans la maille.

Fort : espèces très fréquemment signalées dans la maille.

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Sensibilité saisonnière												
Période sensible (les vautours ne nichent pas dans le département mais peuvent être présents toute l'année). Ils prospectent les milieux ouverts à la recherche de carcasses pour se nourrir, principalement de mars à juin dans le secteur des Préalpes.												
Période la moins sensible												

Réalisé avec le soutien
de la Métropole Nice Côte d'Azur

MÉTROPOLE
NICE CÔTE D'AZUR

l'Europe
s'engage
Provence-Alpes-Côte d'Azur
avec le PRADER

NATURA 2000

RÉGION SUD
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDARITÉ

Réalisation

LPO

AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
Provence-Alpes-Côte d'Azur